

アラグリオ内用剤1.5g

集計期間	2017年12月19日（発売開始日）～2026年3月31日			
副作用発現例数	893例			
器官別大分類	基本語（PT）	重篤	非重篤	総計
胃腸障害	悪心	5	73	78
	胃腸障害		6	6
	口唇腫脹		1	1
	消化不良		1	1
	腹痛		1	1
	変色便		2	2
	便秘		3	3
	嘔吐	5	90	95
一般・全身障害および投与部位の状態	悪寒		1	1
	胸痛	1		1
	胸部不快感	1		1
	発熱		6	6
感染症および寄生虫症	腎盂腎炎	1		1
肝胆道系障害	肝機能異常	5	76	81
	肝障害		14	14
	高ビリルビン血症		5	5
	薬物性肝障害		1	1
眼障害	眼充血		1	1
	眼瞼腫脹		1	1
	視力障害		2	2
	羞明		3	3
血管障害	ショック	4		4
	ほてり		2	2
	起立性低血圧	2		2
	低血圧	153	194	347
	浮動性めまい		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	呼吸困難	1	1	2
	低酸素症	1		1
傷害、中毒および処置合併症	術後尿閉		1	1
	処置後低血圧	1		1
	転倒	1		1
心臓障害	冠動脈攣縮	1		1
	急性冠動脈症候群	1		1
	急性心筋梗塞	2		2
	急性心不全	1		1
	狭心症	1		1
	徐脈	2	1	3
	心筋虚血	1		1

	心筋梗塞	6		6
	心停止	6		6
	心肺停止	2		2
	心房細動	4		4
	頻脈	1	2	3
	不安定狭心症	1		1
	不整脈	1	1	2
神経系障害	意識消失	1	2	3
	意識変容状態	1		1
	一過性脳虚血発作	2		2
	間代性痙攣	1		1
	頭痛		1	1
	脳梗塞	2		2
	麻痺	1		1
	迷走神経障害		1	1
腎および尿路障害	腎機能障害	1		1
代謝および栄養障害	高アミラーゼ血症		1	1
皮膚および皮下組織障害	そう痒症		4	4
	環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫	1		1
	光線過敏性反応	1	36	37
	紅斑		9	9
	接触皮膚炎		2	2
	多汗症		1	1
	発疹		6	6
	薬疹		1	1
	類天疱瘡	1		1
	蕁麻疹		2	2
免疫系障害	アナフィラキシーショック	2		2
	アナフィラキシー反応	1		1
臨床検査	PO2低下		1	1
	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	31	33
	アミラーゼ増加	1	17	18
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	25	27
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	ヘモグロビン減少		1	1
	肝機能検査異常		1	1
	肝機能検査値上昇		5	5
	肝酵素異常		1	1
	肝酵素上昇		10	10
	血圧低下	50	117	167
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
	血中ビリルビン増加		21	21

	血中乳酸脱水素酵素増加		1	1
	好酸球数増加		3	3
	酸素飽和度低下	3	5	8
	心電図S T部分下降	1	3	4
	心電図S T部分上昇	1		1
	心電図異常	1		1
	白血球数増加		1	1
総計		287	802	1089

※調査が終了していない症例も含まれており、今後の調査により副作用名・件数等が変更となる場合があります
 ※副作用名はMedDRA/J（ICH国際医療用語集日本語版）ver28.1で集計しています

お問い合わせ先：日本化薬株式会社 医薬品情報センター 0120-505-282（平日 9:00-17:30）
 医療関係者向け情報サイト メディカルInfoナビ：<http://mink.nipponkaya>